

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

1. 以下何種疾病較不容易造成老年失智症？  
(A)阿茲海默病(Alzheimer's disease, AD)；(B)額顳葉退化(frontotemporal lobar degeneration)；(C)巴金森病(Parkinson's disease, PD)；(D)路易氏體病(Lewy body disease)
2. 以下關於老年失智症的描述何者有誤？  
(A) AD 為最常見的病因；(B)假性失智症(pseudodementia)症狀與患者情緒無關；(C) 記憶力缺損為相當常見的早期症狀；(D)失智症相較癡呆症為較為中性的字眼。
3. 以下記憶歷程何者最可能區辨瞻妄(delirium)與失智症？  
(A)編碼；(B)儲存；(C)提取；(D)固化。
4. 針對篩檢式認知功能檢查的描述下列何者有誤？  
(A) MMSE 為常見工具；(B)適用於大規模篩檢；(C)敏感度佳；(D)施測方便。
5. 以下何者可能不是針對認知障礙症假陽性(false positive)診斷可能帶來的不良後果？  
(A)汙名化；(B)浪費醫療資源；(C)家屬恐慌；(D)低估盛行率。
6. 以下何者非常見正常老化出現的認知改變之領域？  
(A)事件記憶；(B)注意力；(C)處理速度；(D)語意記憶。
7. 關於輕度認知受損(mild cognitive impairment, MCI)的描述何者有誤？  
(A)認知功能受損必為記憶缺損；(B)為介於正常老化與失智症間的灰色地帶；(C)PD 有可能造成 MCI；(D)並非所有 MCI 患者皆會罹患失智症。
8. 以下何種狀況較不可能引發去個人化/去現實感(depersonalization/derealization, DPD)?  
(A)高度壓力；(B)兒童時期創傷；(C)使用致幻劑；(D)過度飲食。
9. 以下關於解離性疾患(dissociative disorders)的描述何者有誤？  
(A) DPD 可能出現在正常個體中；(B)常與創傷後壓力疾患(posttraumatic stress disorder)共病；(C)有解離性失憶(dissociative amnesia)的患者之內隱記憶(implicit memory)通常受損；(D)患者可能無法利用感覺訊息以引導行為。

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

10. 關於身體型症狀與相關疾患(somatic symptom and related disorders)的描述何者錯誤？  
 (A)患者必然沒有生理可解釋的疾病；(B)文化可能影響此疾患的表現；  
 (C)患者對於身體知覺的情緒反應可能異常；(D)患者可能情緒調節功能異常。

11. 以下何種疾患之遺傳率較高？  
 (A)重鬱疾患(major depressive disorder, MDD)；(B)廣泛性焦慮疾患  
 (generalized anxiety disorder)；(C)雙極性疾患(bipolar disorder)；(D)厭食  
 疾患(anorexia nervosa)。

12. 下列心理疾患與治療方式的配對何者的效果可能最差？  
 (A) MDD--認知行為治療；(B) MDD--心理動力治療；(C) Schizophrenia--  
 心理動力治療；(D)強迫症(obsessive-compulsive disorder)--認知行為治  
 療。

13. 以下研究取向最適合探討環境對於心理歷程的影響？  
 (A)病例對照(case control)；(B) 領養研究(adoption study)；連鎖分析  
 (linkage analysis)；(D) 病例報告(case report)

14. 以下何腦部區域與心理病理關聯較低？  
 (A)前額葉(prefrontal cortex)；(B)杏仁核(amygdala)；  
 (C)下視丘(hypothalamus)；(D)上頂葉(superior parietal lobule)。

15. 以下何種神經傳導物質與負向情緒最有關？  
 (A)血清素(serotonin)；(B)正腎上腺素(norepinephrine)；  
 (C)多巴胺(dopamine)；(D)  $\gamma$ -氨基丁酸 (gamma-aminobutyric acid,  
 GABA)。

16. 以下何種狀況較不可能引起譫妄？  
 (A)電解質異常；(B)用藥過量；(C)手術後；(D)情緒不佳。

17. 有關酒精可能引發的障礙，下列何者正確？①中毒譫妄 ②戒斷譫妄  
 ③失智 ④失憶 ⑤精神病症狀 ⑥情感障礙症 ⑦焦慮障礙症 ⑧性功  
 能障礙 ⑨睡眠障礙  
 (A) 僅①②③⑤⑦ (B) 僅②④⑥⑧⑨  
 (C) 僅①⑤⑥⑦⑧⑨ (D) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

18. 經常使用大麻的男性，其會導致的負向結果，以下何者錯誤？  
(A) 降低的注意力；(B) 瞬間經驗再現(flashbacks)；(C) 降低的長期記憶；(D) 降低的精子量

19. 以下何者不是網路遊戲成癮的三大症候群？  
(A) 玩網路遊戲時間過度，已經出現身心問題或功能減損；  
(B) 對網路遊戲活動過度迷戀；一旦壓力大，就更沉迷；  
(C) 不知玩網路遊戲已帶來的壞處，仍沉迷玩遊戲；  
(D) 玩網路遊戲時間愈來愈長才能滿足

20. 下列哪一種不是臨床心理師在面對戒癮個案時能做的事？  
(A) 增加自我覺察，提高戒癮動機；(B) 戒癮計劃表討論  
(C) 戒癮門診及開立戒癮藥物；(D) 討論如何面對高危險情境

21. 以下為精神疾病診斷準則第五版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)對智能障礙的描述。①判斷智能障礙需同時考量智力與適應功能；②中度障礙者，其獨立生活活動需旁人協助；③輕度障礙者，其情緒調控尚未有困難；④適應功能未包含工作表現。請問何項組合正確？  
(A) ①④；(B) ①②；(C) ②③④；(D) ①②④。

22. 現行台灣常用之智力測驗為魏氏系列，描述如後：①魏氏成人智力測驗最新版為第四版；②魏氏兒童智力測驗可用於五歲幼童；③魏氏成人智力測驗可用於16歲青少年；④魏氏幼兒智力測驗可用於兩歲。請問下列組合何者正確？(A) ②④；(B) ①③；(C) ②③④；(D) ①②③。

23. 以下對心理衡鑑的描述，何者為真？  
(A) 心理衡鑑可評估心智功能缺損；(B) 自陳式問卷易作假，不適合用於衡鑑；(C) 心理衡鑑只用於精神科；(D) 心理衡鑑是臨床診斷的唯一依據。

24. 對比精神疾病診斷準則第四版，最新版對厭食症(Anorexia nervosa)診斷標準的更動為何？  
(A) 排除對體重增加的焦慮；(B) 不必無月經；  
(C) 體重只要減輕即可；(D) 不用特意抗拒食物。

25. 異食症(pica)的診斷標準中，何者為非？  
(A) 持續食用無營養、非食物的物質達2週；(B) 該飲食行為不屬於社會文化範疇；(C) 2歲即可診斷；(D) 思覺失調症需被納入臨床判斷。

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

26. 精神疾病診斷準則第五版中，對暴食症(Bulimia nervosa) 的描述何者為非？  
(A) 重度暴食者，每週至少有六次不適當的補償性飲食；(B) 不適當補償飲食行為需每週一次達三個月以上；(C) 中度暴食者，每週有 4 次不適當的補償性飲食；(D) 過度飲食需有一段明確的進食時間。

27. 精神疾病診斷準則第五版中，針對性障礙症的描述何者有誤？  
(A) 障礙需達六個月；(B) 個體對症狀感到明顯壓力；(C) 無法被其他可能診斷所解釋，如：物質濫用；(D) 是由生理因素造成。

28. 何者為性障礙症新增之診斷？  
(A) 女性性興奮障礙 (Female sexual interest/arousal disorder)；(B) 性嫌惡症 (Sexual aversion disorder)；(C) 生殖泌尿系統-骨盆腔疼痛/滲透疾患 (Genito-pelvic pain/penetration disorder)；(D) 男性性欲低落症 (Male hypoactive sexual desire disorder)。

29. 女性性高潮障礙 (female orgasmic disorder) 的描述為，① 常見的共病是憂鬱症；② 常避談性方面議題；③ 各國盛行率從 5 至 10%；④ 環境因素干擾小。請問以下組合何者正確？  
(A) ①②；(B) ②③；(C) ②③④；(D) ①②③。

30. 小明說有外星人在他身上裝竊聽器，又說耳邊聽到有人在罵他，之後其被診斷為思覺失調症，對於病情說明何者有誤？  
(A) 可用羅夏克墨漬測驗評估；(B) 需使用抗精神病藥物治療；(C) 最有可能被判斷為妄想亞型；(D) 越早介入，預後越好。

31. 非藥物性治療中，何者被文獻證明能有效改善思覺失調症患者的職業功能？(A) 敘事治療；(B) 精神分析；(C) 認知復健；(D) 認知行為學派。

32. 近年來，內在表現型 (endophenotype) 常被用於討論思覺失調症的認知缺損，以下何者非內在表現型缺損？(A) 執行功能；(B) 工作記憶；(C) 感覺運動；(D) 自傳性記憶。

33. 妄想疾患 (delusional disorder) 的描述中，何者為真？  
(A) 發病需超過 2 週；(B) 長期憂鬱；(C) 無法以身體畸形症 (body dysmorphic disorder) 解釋；(D) 職業功能明顯受損。

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

34. 小王長期與鄰居不睦，懷疑對方對自己住家動手腳，為此常有情緒起伏。另一方面，他也深信同事背後陷害他，整天怨天尤人，人際關係差。請問：他最可能符合下列何種診斷？  
(A)妄想型人格(Paranoid personality disorder)；(B)反社會人格(Antisocial personality disorder)；(C)邊緣型人格(Borderline personality disorder)；(D)強迫型人格 Obsessive-Compulsive personality disorder)。

35. ①高度尋求他人注意；②不適當的引誘或挑釁互動；③重視言談細節；④特意在乎是否保有吸引人的外表。請問，何種組合對戲劇型人格(Histrionic personality disorder)的描述為真？  
(A)①②③；(B)②③；(C)②③④；(D)①②④。

36. 邊緣性人格(Borderline personality disorder)中，何者描述為非？  
(A)自我感不穩定；(B)不適當飲食；(C)自殺威脅；(D)無解離。

37. 16歲的艾莉專注於拔除毛髮，除了頭髮及眉毛外，她不希望身上有其他的毛髮。然而，她害怕被朋友看到她的身體，所以不曾跟朋友一同游泳。艾莉最有可能被診斷為何種疾患？  
(A) kleptomania；(B) anorexia nervosa；(C) bulimia nervosa；  
(D) trichotillomania

38. 有關自殺的迷思 (myths about suicide)，下列敘述何者正確？  
(A)想自殺的人不見得會清楚地表達出其自殺意圖；  
(B)所有自殺已遂者均是憂鬱症患者；  
(C)罹患疾病末期之病人有可能會自殺；  
(D)會自殺的人不見得罹患心理疾病；

39. ADHD 的診斷，根據 DSM-IV-TR，不論是那一種亞型，應符合：  
(A)症狀至少出現6個月且同時在7歲前即出現；  
(B)症狀至少出現6個月且同時在6歲前即出現；  
(C)症狀至少出現3個月且同時在7歲前即出現；  
(D)症狀至少出現3個月且同時在6歲前即出現

40. 一般來說，對自閉症患者預後的最有利指標，除了較高智力外，是：  
(A)6歲前發展出優秀的識字能力；(B)6歲前發展出語言；(C)6歲前發展出象徵遊戲能力；(D)6歲前發展出特殊能力(如數字、音樂等)

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30

41. 有名 7 歲女孩，最近一個月間，在學校上課期間常出現做鬼臉、清喉嚨、吹鼻息，經老師指正後可以壓抑一小段時間，不久又再次故態復萌，你／妳是臨床心理師，會馬上想到，可能與那種兒童疾患有關？  
(A)品行異常；(B)反抗對立性疾患；(C)妥瑞症；(D)自閉症

42. 蕭小姐被診斷為分裂情感性疾患(schizoaffective disorder)，之前雖然已服用過多種抗精神病藥物，但症狀直到改用帝拔癲(Depakine：Valproate sod.)後才逐漸好轉。因此，其病情也可能符合何種診斷？  
(A)重鬱症(major depressive disorder)；(B)循環性情緒疾患(cyclothymic disorder)；(C)第一型雙極性疾患(Bipolar I disorder)；(D)輕鬱症(Dysthymic disorder)

43. 關於青少年憂鬱與自殺之敘述，下列何者正確？  
(A)青少年自殺行為的重大危險因子之一是情感性疾患；  
(B)11-13 歲之間，是青少年出現自殺嘗試的第一個高峰；  
(C)青少年憂鬱症中，男性的認知功能平均比女性要高；  
(D)青少年憂鬱症中，男性的認知功能平均比女性要低

44. 當代雙相情緒障礙症(bipolar disorders)的神經生物假說，下列何者錯誤？  
(A)多巴胺(dopamine)接受器過度敏感；(B)皮質醇(cortisol)系統的調節功能差；(C)整個大腦神經細胞膜缺陷；(D)血清素(serotonin)接受器過度敏感

45. 有關情緒障礙症(mood disorders)的研究發現，下列何者錯誤？  
(A)雙生子研究指出第一型雙相情緒障礙症(bipolar I disorder)的遺傳性大於鬱症(major depressive disorder)；(B)目前多數研究尚無法確認情緒障礙症的特定基因；(C)證據支持躁症與鬱症和神經突觸間隙的血清素絕對含量太低有關；(D)多數研究指出，血清素傳導基因的多態性(polymorphism)導致憂鬱的易感性(vulnerability)會受生活壓力所影響

46. Julian 是一位參與反恐戰爭的退役美軍。在他服役過程中，有位自殺炸彈客攻擊他們的小隊，造成他的隊友不幸身亡，而他也身受重傷。在他痊癒歸國後，他開始出現失眠、焦躁等適應不良情形。他除了無法擺脫持續不斷闖入的攻擊慘況之外，也出現坐立不安、沮喪等情形。雖然他在現實生活中努力嘗試不去回想當天的情況，並且選擇不接觸軍中的同僚，但是他還是時常在惡夢中驚醒。根據這些描述，Julian 最符合下列

# 亞洲大學

## 109 學年度碩士班考試入學招生考試試題紙

學系別	考試科目	考試日期	時 間
心理學系碩士班(臨床心理學組)	變態心理學	109.3.14	10:30-11:30
<p>何種診斷？</p> <p>(A) generalized anxiety disorder ; (B)panic disorder ; (C) posttraumatic stress disorder ; (D)intermittent explosive disorder</p> <p>47. 有關焦慮症患者的人格特質敘述，下列何者正確？</p> <p>(A) 嬰幼兒時期具有行為抑制(behavioral inhibition)特質的嬰兒未來比較容易形成焦慮症患者；(B)外向性(extraversion)特質明顯者，比較容易成為焦慮症患者；(C)根據實徵研究，神經質(neuroticism)特質與焦慮症的關聯性不高；(D)孩童時期的分離焦慮嚴重度與未來成年時期形成焦慮症的機率沒有太大的關係</p> <p>48. 在 DSM-5 中，身體症狀及相關障礙症之診斷特別強調的是：</p> <p>(A)患者的身體症狀無法以醫學原因解釋；(B)出現身體症狀的部位與形態(C)患者對其身體症狀有異常的想法、感受與行為反應；(D)患者是否理解其對身體健康的憂慮反應過度</p> <p>49. 下列何種處置方式能有效緩和身體症狀及相關障礙症患者的阻抗？</p> <p>(A)教導一般科醫師與其團隊，對患者提供適當的支持、照顧與再保證；(B)幫助個案接受其疾病主要是由心理因素引起；(C)以心理動力療法探索並解決其潛意識衝突；(D)給予衛教以修正其對疾病的誤解</p> <p>50. 小明罹患了憂鬱症且今年報考英檢的成績不及格。若根據憂鬱的無望感理論，小明會如何解釋自己考低分的情況？</p> <p>(A)因為我英文學得太差了；(B)因為我太累了； (C)因為英文總是讓我厭煩；(D)因為我太笨了</p>			