


問答題

1. 請問以固定假牙或固定假牙配合活動假牙進行口腔功能重建時，在選擇支台齒(abutment teeth)上該注意哪些條件與限制？(12.5%)
2. 為什麼一般認為當下顎第一與第二大臼齒缺損時，不宜以延伸至第一顆小白齒到第三顆大臼齒的 5 個單位固定牙橋進行贗復？又如果患者口內具備那些咬合或形態學特徵時，以上述固定牙橋進行治療會有較好的預後？(12.5%)
3. 請比較 polysulfide polymer, condensation silicone, addition silicone, 與 polyether 四類印模材的優缺點？(12.5%)
4. 請問以牙冠牙橋進行贗復治療時，在決定選擇 cusp-marginal ridge 或 cusp-fossa 咬合模式時，該考慮那些因素？(12.5%)
5. 請比較你所知道的各種 tooth-color cement，列出其組成、特質、優缺點。(12.5%)
6. 請闡述 occlusal interference 之定義、臨床表徵、與進行調整時的順序與注意事項。(12.5%)
7. 請說明並比較印模時各種 exposure of finishing line 的方法。(12.5%)
8. 如下圖：陳小姐 26 歲，希望為左下第二大臼齒製作牙冠。臨床發現左下第二大臼齒已經做完根管治療並觀察了一個多月，沒有敲痛或牙根尖病變，牙齒四周無大於 5mm 的牙周囊袋，無可偵測到的動搖度，剩餘牙冠齒質約有 3-walls (只有 distal wall 缺損至靠近牙齦處)，但是牙齒支台高度約為 2~3mm 左右(從牙齦緣量起)，且此時與對咬牙之間的咬合距離不足 2mm。請問你在治療計畫中有哪些考量或在治療過程中會採取哪些方法或步驟，使陳小姐的牙冠能夠有足夠的固持力(retention)與抵抗力(resistance)？(12.5%)



試題隨卷繳回