

# 110 年高雄醫學大學心理學系碩士班「臨床心理學」考題

請清楚標示題號，否則不予計分

## 一、選擇題(每題 3 分)

1. 陳女士在一次中風後，被診斷有 Broca's aphasia，請問陳女士最有可能出現的症狀和受損腦葉分別是？
  - (A)講話常常停頓且構音不清楚、顳葉。
  - (B)聽不懂他人說的話、額葉。
  - (C)講話句子很短且沒有文法結構、額葉。
  - (D)講話內容夾雜創新字、顳葉。
2. 陳先生被診斷為「初期額顳葉型失智症」患者，請問陳先生最不可能出現下列哪一項症狀？
  - (A)對人對事都非常淡漠。
  - (B)記不住對話內容。
  - (C)任何情境中，看到食物拿了就吃。
  - (D)講話時出現找字、命名困難。
3. 王先生被診斷為「初期阿茲海默型失智症」患者，請問王先生的結構性腦造影檢查結果最有可能出現？
  - (A)顳葉內側結構萎縮。
  - (B)頂葉外側面萎縮。
  - (C)額葉外側面萎縮。
  - (D)整體性腦溝與腦室擴大。
4. 下列何種神經傳導素與「阿茲海默型失智症」關係最密切？
  - (A)正腎上腺素(Norepinephrine)。
  - (B)多巴胺(Dopamine)。
  - (C)血清素(Serotonin)。
  - (D)乙醯膽鹼(Acetylcholine)。

5. 下列關於失智症治療，何項敘述錯誤？
- (A)藥物治療只是在延緩症狀惡化(退化)速度，無法根治。
  - (B)抗精神病藥物可以減少失智症患者的攻擊行為，但可能增加死亡的風險。
  - (C)單一認知訓練方案已被證實可改善不同類型的認知功能。
  - (D)運動訓練方案已被證實能改善輕度阿茲海默型失智症患者的認知功能。
6. 關於自閉症類群障礙症的描述，下列何者有誤？
- (A)盛行率約 1%。
  - (B)出現語言發展遲緩。
  - (C)發生在 12-24 個月間。
  - (D)退化發生在 1-4 歲間。
- 7.下列哪一個能力，最能預測自閉症類群障礙症患者的語言發展？
- (A) responding joint attention
  - (B) initiating joint attention
  - (C) theory of mind
  - (D) gesture
8. 關於腦部皮質發展時程，下列何者正確？
- (A)語言區大腦皮質在 2 歲以後，神經元快速生長。
  - (B)大腦前額葉神經元在剛出生時就發生突觸修剪(Synaptic Pruning)。
  - (C)出生到 2 歲間，髓鞘以極快的速度產生。
  - (D)大腦語言區的突觸連結是最慢達到成人水準的區域。
9. 關於晶體智力與流體智力的描述，何者正確？
- (A)工作記憶是晶體智力
  - (B)字彙知識是流體智力
  - (C)晶體智力在青春期發展達到高點
  - (D)流體智力在成年早期發展達到高點
10. 當一個嬰兒指著遠方的小鳥，希望母親去注視，這個行為什麼？
- (A) joint attention
  - (B) eye contact
  - (C) pointing
  - (D) showing

11. 有關貧語之定義，下列何者正確？
- (A) 僅說話少。
  - (B) 少說話而且說話內容空洞。
  - (C) 僅說話內容空洞。
  - (D) 說話少或說話內容空洞。
12. 小明是個高中男生，上廁所時都得等上課鈴響，同學幾乎都進教室後才衝進獨立隔間的男廁，關起門來小便。他知道與其他男生一起在小便池小便沒什麼好怕的，但是他就是怎麼樣也做不到。對小明的診斷很可能是下列何者？
- (A) 特定場所恐懼症。
  - (B) 社交恐懼症。
  - (C) 恐慌症。
  - (D) 特定恐懼症。
13. 有關恐慌症的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 恐慌發作後，患者極端害怕下一次的發作。
  - (B) 它的發作通常會有某種預警。
  - (C) 它與生活壓力事件有關。
  - (D) 它的特徵是強烈焦慮的突然高漲。
14. 根據行為理論，下列何種歷程是促使強迫行為持續出現的主要因素？
- (A) 強迫思考減少：正增強。
  - (B) 強迫思考減少：負增強。
  - (C) 焦慮減少：負增強。
  - (D) 焦慮減少：正增強。
15. 下列何種物質，使用後會同時出現欣快感與精力充沛的現象？
- (A) 大麻。
  - (B) 古柯鹼。
  - (C) 酒。
  - (D) 海洛因。
16. 有關飲食疾患的描述，下列何者錯誤？
- (A) 厭食症與暴食症患者的血清素代謝物含量都偏高。
  - (B) 高飲食限制傾向的受試者，看到食物時，其大腦背側紋狀體(dorsal striatum)的多巴胺活性會增加。
  - (C) 厭食症患者有較高的完美主義傾向、害羞與服從性高。
  - (D) 暴食症患者有較高的情緒不穩定與戲劇性傾向。

17. 有 25-50%的癌症患者重複接受化學治療會產生預期性噁心的現象，甚至有些患者只要想到隔天要去醫院，就開始出現噁心與嘔吐的現象，此種反應是什麼樣的心理歷程？

- (A)操作制約。
- (B)古典制約。
- (C)習得無助。
- (D)效果率。

18. 有關壓力與冠心病的身心連結，下列何者錯誤？

- (A)壓力會引起內分泌系統釋放兒茶酚胺，而損害動脈與心臟。
- (B)壓力會引發心律不整，嚴重時可能導致猝死。
- (C)行為因素(例如：吸菸、大量飲酒)會透過直接生理路徑引發冠心病。
- (D)壓力會引起心血管反應性，使心跳與血壓升高，長期可能會導冠心病。

19. 下列何者治療技巧不是 Freud 常用的技巧？

- (A) free association
- (B) catharsis
- (C) dream interpretation
- (D) motivation therapy

20. 根據 ABC assessment，A 是行為的 Antecedent conditions，B 是 Behavior，C 是行為的\_\_\_\_\_？

- (A) Conditions
- (B) Correspondences
- (C) Consequences
- (D)Control

## 二、問答題

(一)、請就 DSM-5 診斷標準，說明輕型認知障礙症(Mild neurocognitive disorder)與認知障礙症(Major neurocognitive disorder)的主要差異。(10分)

(二)、請舉例說明 goodness of fit (5分)與 equifinality (5分)

(三)、發展邊緣型人格障礙之辯證行為治療的學者 Linehan 主張：當病患感到糟糕情緒永無止境地持續，會導致其自殺意念出現。要介入此項危機，重要目標之一為：增加病患的痛苦耐受力(distress tolerance skills)。請說明其作法，以及由 Linehan 理論說明這作法與情緒調節的關聯。(10分)

(四)、請簡述歸因理論與憂鬱症之關係。(10分)

