

科目：基本護理學

系組：護理學系

年級：三

有關測驗題作答規定：

1. 未按作答格式(範例)作答者，扣該科總分 10 分。
2. 未在彌封答案卷內作答者，扣該科總分 20 分。

作答範例

選擇題(92%) 每題 2 分

1.A	2.A	3.B	4.B	5.C
6.A	7.A	8.D	9.C	10.B
11.A	12.A	13.D	14.A	15.D

請依照上述範例之格式，以橫式書寫方式將全部答案寫在彌封答案卷第□頁內
答案字母請用正楷大寫(A、B、C、D……)

問答題(8%)每題 2 分

56. XXXXXXXXXXXXXXXXX

請依照上述範例之格式，標註作答题號，以橫式書寫方式將全部答案寫在彌封答案卷第□頁內。

一、選擇題(92%) 每題 2 分

- 1 有關鼻胃管餵食的敘述，下列何者不正確？(A)灌食前先反抽，若未消化的胃內容物超過 100 c. c. 則暫不餵食 (B)每次灌食量約 500~1,000 c. c. (C)較黏稠的食物可添加開水以利灌食 (D)灌完食物，須再灌以 20~30 c. c. 的開水。
- 2 照護管灌餵食的病患時，關於預防病患嘔吐的措施何者不正確？(A)灌食時管內溶液勿流空，以防空氣進入腸胃道 (B)每次灌食前需評估胃內食物存留量 (C)飲食中可加入黑棗汁以促進腸蠕動 (D)灌食時和灌食後半小時至一小時內抬高床頭 30 度。
- 3 關於照護管灌餵食病患的敘述，何者錯誤？(A)調製管灌飲食時需要以外科無菌技術執行 (B)可利用重力原理或灌食幫浦來調整灌入的速度 (C)應注意監測個案是否有腹脹、腹瀉或便秘情形 (D)吸入性肺炎是病患常見的一種合併症，因此灌食前反抽以確定導管位置是重要的。

情況：王先生，55 歲，貨運司機，國小畢業，因車禍骨折入院，請回答 4 -8 題。

- 4 依醫囑需要給予王先生靜脈輸液，下列關於靜脈注射部位選擇之敘述何者正確？1 可選擇已經多次穿刺的部位 2 原則上應由遠端靜脈到近端 3 穿刺部位要盡量選擇對病人活動限制最少的部位 4 選擇下肢靜脈較為安全。(A) 1 2 (B) 1 3 (C) 2 3 (D) 2 4。

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：基本護理學

系組：護理學系

年級：三

- 5 王先生依醫囑接受靜脈輸注 0.45% 氯化鈉溶液 500 c.c. 需於 4 小時滴完。若以精密輸液管輸注，下列敘述何者正確？(A) 滴速維持約 30 gtt/min，並監測其有無出現細胞性脫水 (B) 滴速維持約 60 gtt/min，並監測其有無出現反彈性血鈉過高 (C) 滴速維持約 100 gtt/min，並監測其有無出現組織飽滿度下降 (D) 滴速維持約 125 gtt/min，並監測其有無出現水中毒症狀。
- 6 王先生體重 70 公斤，因手術後傷口感染接受 prostaphylline 靜脈注射治療，醫囑為「prostaphylline 2 gm IVF q6h」，現 prostaphylline 500 mg/vial，請問護理人員每次給藥時，需給多少 vail 的 prostaphylline？(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8。
- 7 手術後王先生按 nursing call 主訴傷口疼痛，護理師回答說：「醫生有開 p.r.n. 的止痛藥，你需要嗎？」。王先生沒有回答。五分鐘王先生又按 nursing call 抱怨傷口痛的不得了，為何還不開止痛藥？依此情況護理師與王先生的溝通發生什麼問題？(A) 無訊息的發送者(Sender) (B) 訊息(Message) 不清楚 (C) 無訊息的接受者(Receiver) (D) 無效的訊息途徑(Channel)
- 8 護理師趨前觀察王先生的症狀(symptoms)與徵象(signs)，下列哪些項目是屬於症狀？1 紅、腫、熱、痛 2 血壓 3 體溫、脈搏、呼吸 4 臉色蒼白 5 傷口分泌物 (A) 145 (B) 123 (C) 235 (D) 134
- 9 下列各項輸液，哪些屬於等張性溶液？1 林格氏液(Ringer's solution) 2 台大 5 號 3 2.5% 葡萄糖水溶液 4 0.45% 食鹽水溶液 5 乳酸鹽林格氏液(lactated Ringer's solution)。(A) 12 (B) 34 (C) 15 (D) 25。
- 10 關於執行正確和安全的給藥給藥前，下列敘述何者正確？(A) 必須遵守「三讀」及「五對」之原則 (B) 病人、藥物、劑量、給藥次數及給藥途徑正確為五對 (C) 三讀是指取藥前默念三遍藥名 (D) 白班 9 點的藥應由大夜班備藥以免延誤白班發藥。
- 11 下列各項有關肌肉注射部位的敘述，何者正確？(A) 股外側肌上 1/3 處是最適合提供幼兒肌肉注射用 (B) 三角肌最佳注射部位是在肩峰下三橫指處 (C) 背臀肌的注射部位約位於臀部內側 1/4 處 (D) 將右手放在右股骨大轉子上，食指在髂骨前上棘，張開中指，中間「V」字形即為側臀肌最佳注射部位。
- 12 下列有關口服給藥敘述，正確者為：(A) 服用咳嗽糖漿、胃乳時，需立即喝大量開水以增加藥效 (B) 含碘劑藥物需先稀釋後再以吸管服用 (C) 促進消化吸收的藥物，應於飯後服用效果最佳 (D) 硝酸甘油酯(Nitroglycerine) 咀嚼後吞服可增強吸收效果。
- 13 護理人員為男病人執行存留導尿時，下列措施何者正確？(A) 導尿管固定於大腿內側 (B) 分別以優碘棉籤與生理食鹽水棉籤，由尿道口向外環形消毒 (C) 手持紗布握持陰莖與水平約呈 30~45 度角 (D) 讓病人採屈膝仰臥的姿勢。

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：基本護理學

系組：護理學系

年級：三

- 14 有關為女病患執行會陰沖洗技術，下列敘述何項正確？ (A)清洗時方向應由尿道口往陰道口沖洗 (B)壺嘴宜朝床頭方向沖水 (C)以乾棉枝擦乾時不可擦到肛門 (D)選用大棉枝則不須戴手套。
- 15 有關灌腸的禁忌症，下列何者錯誤？
(A)腦壓高患者 (B)安胎者 (C)肝性昏迷患者 (D)直腸狹窄者。
- 16 術後病患意識尚未清醒，腋溫 35°C 且有寒顫現象，其最佳的保暖方式為下列何者？ (A)給予水溫 $40.5\sim 46^{\circ}\text{C}$ 之溫水浸泡 (B)關閉冷氣 (C)使用約 $46.1\sim 51.7^{\circ}\text{C}$ 之熱水袋 (D)距離病患身體 18~24 吋，給予 40W 烤燈。
- 17 護理人員協助個案溫水坐浴時，常用下列何種溶液？ 1 一般溫開水
2. 1:4000 的萊蘇(lysol)溶液 3. 1:100 水溶性優碘(Beta-iodine)
4. 1:400 沙威隆 5. 10~50%硫酸鎂(MgSO_4)溶液 6. 1:1000 高錳酸鉀溶液(P.P. solution) (A)146 (B)135 (C)256 (D)234
- 18 臨床上以溫水拭浴取代酒精拭浴之理由，主要為下列何者？
(A)酒精拭浴須由醫師開立醫囑後才能執行，增加行政處理上的困擾 (B)酒精太貴，成本太高 (C)酒精具揮發性，病患易有頭痛、暈眩與流鼻血的主訴 (D)酒精降溫速度很快，且具刺激性，易造成皮膚乾燥及噁心感。
- 19 張先生因即將接受手術治療，詢問護理人員：「明天開刀會不會怎樣？」，護理人員的回應下列何者不適當？ (A)「不用擔心，我們醫師的技術都是非常高明的，不會有問題的！」 (B)「你希望多瞭解哪方面的訊息？」 (C)「你是在擔心什麼嗎？」 (D)「你所說的會不會怎樣是什麼意思？」
- 20 李先生腹部手術後，醫囑開立「Profenid 30mg I.M. p.r.n.」(profenid 50mg/6c.c./vial)。這是屬於哪一類醫囑？
(A)臨時 (B)長期 (C)單次 (D)口頭。
- 21 陳老太太因麻痺性腸阻塞住院，目前 NPO，插鼻胃管間歇引流中，並以靜脈點滴提供水分及營養。若陳老太太抱怨口渴，想喝水，此時合宜的護理措施為何？ (A)讓病患口含冰塊 (B)調快靜脈點滴流速 (C)給予口腔護理 (D)降低鼻胃管抽吸壓力
- 22 吳太太 70 歲，因肝硬化於醫院往生，護理人員欲進行遺體護理，下列措施何項錯誤？
(A)若有髮夾等尖銳物，最好先取下 (B)拔除吳太太身上所有導管
(C)可將吳太太之假牙戴上 (D)為尊重吳太太，進行遺體護理不應戴手套
- 23 臨終病人向護理人員說：「我看到我死去的老伴來找我，要我去陪他。」護理人員適當的處理方式為何？ (A)提供宗教專職人員之協助 (B)安慰病人情緒，告知勿想太多 (C)傾聽病人的陳述，表達了解其內心焦慮 (D)否定病人的陳述，給予現實感
- 24 李先生 40 歲，因車禍被送到急診，已無生命徵象，李太太在一旁不斷對著醫護人員說：「你們趕快救他，他還沒有死。」李太太此時正處於哀傷過程中的那一階段？ (A)磋商期 (B)否認期 (C)憤怒期 (D)憂鬱期

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：基本護理學

系組：護理學系

年級：三

- 25 有關等長運動的敘述，何者正確？(A)指關節的活動與肌肉長度的改變 (B)能預防關節僵硬，維持關節的活動度與柔軟度 (C)肌肉張力增加但無關節的活動與肌肉長度的改變 (D)肌肉收縮時肌肉長度改變而張力不變
- 26 有關睡眠週期中之快速動眼期的敘述，何者正確？(A)胃液分泌增加 (B)心輸出量減少，血壓、心跳下降 (C)肌肉張力增加 (D)通常發生於入睡後20分鐘左右，持續10～20分鐘。
- 27 生長激素主要在睡眠哪個時段分泌較多？(A) NREM stage IV (B) NREM stage III (C) REM (D) 平均在每一時段。
- 28 長期臥床不動的病人，髖關節最易造成何種變化？(A)外旋轉(external rotation) (B)內翻(inversion) (C)屈曲(flexion) (D)外翻(eversion)。
- 29 鼓勵使用石膏固定的病患執行等長運動，主要的目的為：(A)增加肌肉的力量 (B)刺激血液循環 (C)維持關節的活動度 (D)預防壓瘡形成。
- 30 下列何者不屬於院內感染(nosocomial infection)？(A)經由產道而得到的新生兒感染 (B)外科手術後傷口發炎或化膿 (C)病人因膽囊炎住院而後併發腹膜炎 (D)住院病人靜脈注射部位發現有化膿現象。
- 31 下列有關A.A.D的醫囑，何者正確：
(A)醫師不同意，但病人要求出院 (B)病人不同意，但醫師要求出院
(C)醫師不同意，但病人要求轉院 (D)病人不同意，但醫師要求病人轉院。
- 32 病人住院期間跌倒所引起的身體傷害，是屬於下列何者？(A)感染性傷害 (B)熱性傷害 (C)機械性傷害 (D)化學性傷害。
- 33 最適合氣喘個案的醫療環境溼度為何？
(A) 10～20% (B) 30～50% (C) 50～70% (D) 80%以上。
- 34 以聽診測量血壓，成人舒張壓應為柯羅德科夫氏音的第幾期？
(A)第一期 (B)第二期 (C)第四期 (D)第五期。
- 35 下列有關換氣過度(hyperventilation)的敘述，何者錯誤？
(A)庫斯毛耳氏(Kussmaul's)呼吸即屬此類 (B)會造成PaCO₂上升
(C)可見於糖尿病酮性昏迷病人 (D)身體體液偏向於鹼性。
- 36 在下列何種情況下在量血壓時會有假性偏高的情形？
(A)病人剛從浴室洗完澡出來 (B)測量血壓時放氣太快，引起靜脈充血 (C)病人剛從床上站起來，姿位改變 (D)測量的手臂位置高於心臟。
- 37 「Demerol 50g I.M. q6h. p.r.n.」醫囑的執行方式，以下何者正確？
(A)固定每隔6小時給藥一次 (B)護士可自行評估，需給藥時每隔6小時可給一次
(C)每日給藥6次 (D)每隔6小時通知醫師後可給藥一次

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。

科目：基本護理學

系組：護理學系

年級：三

- 38 有關醫囑縮寫名詞的解釋，下列何者正確？ 1 I.C. 是指「皮下注射」 2. p.r.n. 是指「臨時醫囑」 3.A.S. 是指「左耳」 4.E.D.C. 是指「預產期」 5.A.A.D. 是指「自動出院」 (A)124 (B)125 (C)235 (D)345
- 39 醫囑Adalat 1# S.L.，下列服藥方法何者適當？
(A)吃飯前，服用藥物 (B)喝水後將藥物吞下
(C)將藥物含於舌下 (D)咀嚼藥物後，再喝水吞下藥物
- 40 以問題為導向的紀錄，以下何者正確：
(A)S：熱敷腹部 (B)O：主訴噁心 (C)A：皺眉 (D)P：協助左側臥以避免壓迫傷口
- 41 有關病歷的保存，下列何者正確？
(A)人體實驗個案病歷應永久保存 (B)成年個案的病歷需保存8年
(C)未成年個案病歷保存到其成年後8年
(D)病歷保存由各醫院自行制定原則
- 42 醫囑「Cefazoline 400mg I.M. q8h」，護理人員應如何執行？
(A)每天8AM給予肌肉注射Demerol 400mg一次
(B)肌肉注射Demerol 400mg一天3次，時間為9 AM, 1PM, 5PM
(C)肌肉注射Demerol 400mg一天3次，時間為9AM, 5PM, 1AM
(D)肌肉注射 Demerol 400mg 一天 3 次，時間為 8AM, 4PM, 12AM
- 43 王伯伯，因心臟病入院治療，目前有下列四個健康問題，護理人員應優先處理哪一項？ (A)焦慮 (B)失眠 (C)低心輸出量 (D)便秘
- 44 關於護理目標的訂定原則，下列敘述何者為非？
(A)應建立在個案能力所及的範圍內的 (B)是符合實際現況的
(C)是不受時間所限制的 (D)是可測量
- 45 病人抱怨痛到睡不著覺，護理人員處理之第一步驟應為：
(A)建議放鬆心情，以減輕疼痛而有利入睡 (B)從身心社會評估病人的疼痛情形
(C)報告醫師病人有疼痛問題 (D)確立目標病人能於服用藥物後入睡
- 46 有關護理目標的訂定，下列何者最適當？
(A)能有足夠的飲水 (B)每日有規律且合宜的睡眠
(C)每日健走至少 5000 步 (D)每日能有充足時間做運動

二、問答題(8%) 每題 2 分

47. 請依序說明正確的五個護理過程步驟？
48. 於體溫表40℃以上欄位記錄時，需使用紅筆填寫之內容，請舉例四項？
49. 確立護理診斷的基本構成要素為「P、E、S」，請說明P、E、S為何？
50. 分析、解釋所收集的資料，以確定個案的健康問題，是護理過程中的哪一個步驟？

※ 注意：1. 考生須在「彌封答案卷」上作答。

2. 本試題紙空白部份可當稿紙使用，試題須隨答案卷繳回。

3. 考生於作答時可否使用計算機、法典、字典或其他資料或工具，以簡章之規定為準。