

亞東技術學院 99 學年度第二學期日間部暨進修部

轉學招生考試 內外科護理學 試題

注意事項：

- 一、本試題共有 50 題，每題均須作答，總分 100 分。
- 二、請於答案卷中作答，否則不予計分。
- 三、答案卷上請用藍色或黑色筆繕寫。
- 四、作答時請先標明題號橫式書寫。

() 1、常用的腫瘤指數包括：

- (A) CA 199 及 CPK (B) CA 125 及 CEA
- (C) PSA 及 CA199 (D) B + C
- (E) A + B + C

() 2、病人之 WBC:1200, Blast:3% Band:2% Mono:4% Baso:5% Seg:7%，請計算病人之 ANC？

- (A) 108 (B) 120 (C) 132 (D) 以上皆非

王女士，32 歲，超過標準體重 15 公斤，至門診進行每年公務人員健康檢查，在候診時，詢問護理人員有關乳癌的預防及如何自我檢查，請依王女士的狀況回答下列 3-4 題

() 3、有關衛教王女士預防乳癌的知識，下列何者正確？

- ① 初經在 12 歲以後，停經在 55 歲以前是發生乳癌的高危險期 ② 每年進行一次乳房攝影檢查 ③ 降低含高脂肪食物的攝取 ④ 與營養師討論減輕體重的方法 ⑤ 適當的運動及休閒活動

- (A) ③④⑤ (B) ①③④⑤ (C) ①②③④ (D) ①②③④⑤

() 4、有關教導王女士乳房自我檢查的步驟，下列何者正確？

- ① 每個月月經結束後 7-10 天進行乳房自我檢查 ② 以手掌進行乳房自我檢查 ③ 檢查乳房時需包含乳房的尾部及乳房周圍的淋巴結 ④ 以同心圓或放射狀方式，按壓乳房，檢查是否有硬塊 ⑤ (E) 以大拇指和食指壓擠乳頭每一部份，觀查有無任何分泌物

- (A) ①②③④ (B) ②③④⑤ (C) ①③④⑤ (D) ①②③④⑤

() 5、下列何項不是病人施行胃造瘻術之目的？(A)灌食途徑 (B)減輕腸胃道壓力 (C)引流胃內容物 (D)排出腸道廢物。

() 6、吳先生剛做完經皮肝臟活體組織切片檢查，此時護理他時，下列何者是最重要的措施？(A)評估其腹骨盆部位的疼痛感 (B)監測其出血的症狀及徵象 (C)向其解釋疾

病的診斷及治療方針 (D)為其下床活動做準備。

- () 7、下列哪一種消化性潰瘍手術，病人在手術後會發生胃排空 (gastric empty) 變差的併發症？(A)Billroth I 型手術 (B)Billroth II 型手術 (C)兩側迷走神經幹切除術 (D)幽門成形術。
- () 8、追蹤結腸癌病人在手術後是否有復發，應檢測何種腫瘤標幟？(A)AFP (alfa fetal protein) (B)CEA (carcinoembryonic antigen) (C)PSA (prostatic acid phosphatase) (D)CA-125。
- () 9、側結腸癌和直腸癌的病人會出現哪些臨床表徵？1 貧血 2 腸道阻塞 3 裏急後重 4 排便習慣改變 5 噁心、嘔吐。(A) ①②④ (B) ②④⑤ (C) ②③④ (D) ①③⑤。
- () 10、幾種肝炎病毒會導致慢性肝炎？1 A 型病毒 2 B 型病毒 3 C 型病毒 4 D 型病毒 5 E 型病毒。(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ①②⑤ (D) ②④⑤。
- () 11、B 型肝炎病毒感染後，下列血清學檢驗出現何種情況，代表病人的傳染力很強？(A)HBsAg (+)、anti-HBc (+) (B)anti-HBe (+++) (C)anti-HBc (+++) (D)HBsAg (+)、HBeAg (+)。
- () 12、下列哪一種原因導致的肝硬化，其肝組織切片的結節病變均小於 1cm，又稱為小結節肝硬化？(A)酒精性肝硬化 (B)壞死後肝硬化 (C)膽源性肝硬化 (D)心因性肝硬化。
- () 13、腹部手術病人，午夜後禁食的目的在避免手術時產生嘔吐，而造成下列現象，何者為非？(A)阻塞呼吸道 (B)胃脹 (C)吸入性肺炎 (D)污染手術台。
- () 14、有關肝性腦病變急性期的治療，下列何者正確？(A)lactulose 可升高腸道的 pH 值 (B)靜脈滴注 neomycin (C)每日蛋白質攝取 40~60 gm (D)禁止給排鉀性利尿劑。
- () 15、下列有關全腸胃道外營養法 (TPN) 之描述，何者錯誤？(A)最常用的輸液管路是鎖骨下靜脈 (B)常使用的溶液為 10%葡萄糖、蛋白質及脂肪乳化溶液 (C)脂肪乳化溶液的滴注速度不可過快 (D)每四小時應測尿糖和尿中酮體。
- () 16、胰臟炎患者，採禁食、鼻胃管減壓引流的目的為：(A)減緩因胰臟發炎所造成的腸阻塞症狀 (B)抽出先前留在腸道中無法消化的食物以減輕腹痛 (C)抽出所分泌的胰澱粉酶及胰脂肪 以避免刺激腸道造成腹痛 (D)減輕因胃酸分泌刺激發炎的胰臟讓腸胃道及胰臟休息。

- () 17、肝硬化因嚴重腹水及足部水腫之個案，目前使用利尿劑治療，以下護理措施何者正確？(A)鼓勵多下床活動以促進腹水的重吸收 (B)宜採一般飲食以維持血鈉正常 (C)應大量喝水，以防過度脫水造成頭暈、低血壓 (D)監測體重，每日的體重變化不宜下降超過 2 公斤以上。
- () 18、病患目前診斷為急性胰臟炎，則不宜使用以下何種藥物？(A)tagamet (B)demerol (C)morphine (D)anticiide。
- () 19、剛拔除氣管內管的患者，護理人員應注意病人是否發生下列何種呼吸窘迫和低血氧的徵象？1 不安 2 激躁 3 心搏過速 4 呼吸過慢 5 氧分壓降低 6 二氧化碳分壓降低。
- (A) ①③④⑤ (B) ②④⑤⑥ (C) ①②③⑤ (D) ①③⑤⑥。
- () 20、護理置有胸腔水下引流裝置之病人時，下列敘述何者錯誤？(A)水封瓶內於吸氣時會有間歇性氣泡產生 (B)咳嗽或深呼吸時水封瓶中長玻管內之液面會上下浮動 (C)鼓勵經常作深呼吸及咳嗽 (D)胸部 X 光確定肺臟已完全膨脹時才可拔除胸管。
- () 21、胸腔病人使用胸腔水下引流裝置時，下列那些情況發生時可以夾住胸管？1 胸瓶打破時 2 更換胸瓶時 3 懷疑漏氣時 4 轉病房時 5 銜接處鬆脫時。(A) ①②③④ (B) ②③④⑤ (C) ①②③⑤ (D) ①②④⑤。
- () 22、下列何種胸腔疾病是因氣體交換的部位發生病變？(A)慢性支氣管炎 (B)哮喘 (C)肺氣腫 (D)支氣管擴張症。
- () 23、王先生今晨因氣喘發作導致呼吸窘迫，被送至急診室，依四分法您判斷其緊急程度為：(A)Class I (B)Class II (C)Class III (D)Class IV。
- () 24、護理肺結核病人，合宜之護理措施為：(A)病患在服藥過程中，若出現藥物的副作用應自行調整劑量 (B)病患服用 Ethambutol (EMB) 應注意視力紅綠顏色之辨別能力 (C)一般個案在服藥後 1~2 週，結核菌感染力下降，不需加以隔離 (D)所使用過的東西或進食餐具均需煮沸消毒。
- () 25、指導慢性阻塞性肺疾病患者執行正確的橫膈式呼吸應為：(A)吐氣時收縮腹部肌肉，吸氣時腹部上升 (B)通常以平躺姿勢練習橫膈式呼吸最佳 (C)吸氣時間是呼氣時間的二倍 (D)其目的為增加呼吸速率及增加潮氣量。
- () 26、69 歲男性，患有充血性心衰竭而住院。醫師開立藥物 furosemide 60mg IV stat, digoxin 0.25mg po, and KCL 20 mEq p.o, 給藥兩小時後，下列何項數值代表對藥物無效的反應？(A)脈搏規則，每分鐘 89 次 (B)尿液排出 60ml (C)SPO2 94% (D)

下肢凹陷性水腫

- () 27、充血性心衰竭患者使用 beta-blocking agent，下列何項為預期的治療效果？
(A) 倦怠改善 (B) 心跳速率減少 (C) 血壓上升 (D) 排尿量增加
- () 28、充血性心衰竭患者使用 ACE inhibitor，下列何項為最適當的護理措施？
(A) 監測病人的尿量 (B) 評估病人皮膚的完整性 (C) 評估病人心跳速率 (D) 監測血壓變化
- () 29、心肌梗塞患者易產生心因性休克的合併症，護理人員需小心監測下列何項表徵？
(A) 心搏過緩 (B) 心室心律不整 (C) 舒張壓上升 (D) 中心靜脈壓下降
- () 30、一位心肌梗塞患者，2 天前入院，今早護理人員發現病患兩側下肢水腫 2+，護理人員應優先執行下列何項護理措施？ (A) 明早開始每天測體重 (B) 回顧並記錄過去兩天的輸入及排出量 (C) 建議醫師限制鈉的攝取 1g/day (D) 將利尿劑給予的時間從早上改至下午
- () 31、下列何項病患的疾病史，不會使其心衰竭更加重惡化？
(A) 心房纖維顫動 (B) 營養不良性貧血 (C) 消化性潰瘍 (D) 最近曾有上呼吸道感染
- () 32、一位心肌梗塞病患，突然發生心搏過速、air hunger、咳嗽且帶有粉紅色泡沫痰，下列何者為預期可聽診的呼吸音？
(A) Stridor (B) Crackles (C) Scattered rhonchi (D) Diminished breath sounds
- () 33、Digoxin 的血清治療劑量為？
(A) 0.5~2 ng/ml (B) 1.2~2.8 ng/ml (C) 3~5 ng/ml (D) 3.5~5.5 ng/ml
- () 34、病患使用 heparin 靜脈注射治療，護理人員需監測下列何項數值？
(A) Hematocrit (B) Hemoglobin (C) Fibrinogen (D) Activated partial thromboplastin time
- () 35、病患使用 heparin 靜脈注射治療時，護理人員需同時備妥下列何項藥物？
(A) Protamine sulfate (B) Potassium chloride (C) Aminocaproic acid (Amicar) (D) Vitamine K
- () 36、一位急性心肌梗塞病患開始使用 tPA, Activase 治療，為監測其合併症，下列何項臨床數值，護理人員最不需要時常評估？
(A) 神經系統症狀 (B) 腸蠕動音 (C) 血壓及脈搏 (D) 病患是否有腹痛及背痛情形
- () 37、一位 right-sided CVA 的病患，護理人員評估後發現有單側忽略的情形，下列何項為最需優先執行的護理措施？
(A) 提供病患溝通的板子 (B) 將餐盤放置於右側 (C) 提醒病患要隨時注意左側的肢體 (D) 提供左側肢體被動關節全範圍運動
- () 38、護理人員走進病室中，病患正平躺，其妻正用手協助搓揉病患的肢體。病患 7 天前罹患 left-side CVA，有吞嚥困難的情形，並有一留置尿管。下列何項為最需優先執行的護理措施？ (A) 抬高床頭 (B) 鼓勵其妻放慢與病患說話的速度 (C) 提醒病患常注意左側的肢體 (D) 評估尿液的量及顏色
- () 39、協助一位有吞嚥困難進食口服藥，下列何項為最適當的護理措施？

- (A) 將磨碎的藥物與冷水混合服用 (B) 將磨碎的藥物與 120c.c.的蘋果汁混合服用 (C) 將磨碎的藥物溶解於 30c.c.的溫水服用 (D) 將磨碎的藥物與較濃的流質混合服用
- () 40、病患在床上剛發生 generalized tonic-clonic type seizure，下列何項最需優先執行的護理措施？
(A) 記錄結果 (B) 維持安靜的環境 (C) 促進病患對週遭環境的定向感
(D) 維持病患左側臥姿勢
- () 41、對於一位顱內壓升高的病患，應避免下列何種姿勢？
(A) 頭維持在正中線 (B) 頭朝向側邊 (C) 頸部維持正中線 (D) 床頭抬高 30~45 度
- () 42、病患發生 complete right-sided hemiparesis，護理人員可預知其情形為？
(A) 病患雙側手腳完全麻痺 (B) 病患右側肢體軟弱無力，包括臉及舌頭
(C) 病患喪失右手的活動能力，但仍能獨立行走 (D) 病患喪失獨立行走的能力，但仍可以自行進食及沐浴不需協助
- () 43、當與失語症病患溝通時，下列何項為最不適當的護理措施？
(A) 放慢與病患說話的速度 (B) 允許病患較長的反應時間
(C) 協助病患完成其無法說完的句子 (D) 說話時直接注視病患
- () 44、下列何項為 Parkinson's disease 常見的步態？
(A) Unsteady and staggering (B) Shuffling and propulsive (C) Broad-based and Waddling (D) Accelerating with walking on the toes
- () 45、當病患患有第 2 對腦神經缺損時，下列何項為最適當的護理措施？
(A) 放大對病患說話的音量 (B) 注意沐浴時的水溫 (C) 注意食物的溫度
(D) 下床活動時，移除周圍的障礙物
- () 46、當測試第 3、4、6 對腦神經的協調功能時，下列何項為測試的項目？
(A) Corneal reflex (B) Pupil response to light (C) Six cardinal fields of gaze
(D) Pupil response to light and accommodation
- () 47、診斷為 Guillian-Barre Syndrome 的病患，護理人員需注意收集下列何項病史？
(A) 腦部創傷 (B) 過去 5 年是否曾罹患腦膜炎 (C) 背部創傷或脊髓損傷
(D) 過去幾個月曾發生呼吸道或腸胃道的感染
- () 48、當病患神經系統缺損擴及邊緣系統 (limbic system)，護理人員預期會發生下列何項症狀？ (A) 對人、時、地的定向感喪失 (B) 情感淡漠 (C) 近期記憶減退
(D) 喪失計算能力
- () 49、當對意識不清的病患進行疼痛刺激時，下列部位何項最適當？
(A) 胸骨 (B) 指甲床 (C) 眼睛周圍 (D) 胸鎖乳突肌
- () 50、對於 seizure 病患的護理措施，下列何項不適當？
(A) 穿著寬鬆的衣服 (B) 約束病患的肢體 (C) 移除枕頭、拉起床欄
(D) 維持側臥，頭部屈曲往前

※本試題紙請隨答案卷繳回※