

100 學年度第 2 學期台南區 2 所科技大學聯合招收轉學生考試試題

- 四技二年級
 四技三年級
 二技三年級

科目：內外科護理學

考試時間：60 分鐘

注 意 事 項	一、答題請依題號順序劃記在答案卡上，寫在試題紙上無效；答案卡限用 2B 鉛筆劃記，未按規定劃記，致電腦無法讀取者，考生自行負責。 二、本科試題為單選題（答錯不倒扣），共計 100 分。 三、本科試題共 3 頁，如有缺少，應立即舉手，請監試委員補發。
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

准考證號碼

□□□□□□□□

*請先填准考證號碼，並在答案卷依序作答。

共 3 頁 第 1 頁

- 有關頭部外傷 (head injury) 病患的護理措施，下列何者錯誤？(A)定時測試意識程度及瞳孔反應(B)維持呼吸道通暢，採平躺，保持頭頭在平直位置(C)避免給液過多，須記錄輸出入量，維持水分平衡(D)創傷初期，腸蠕動未恢復前，必須禁食。
- 下列何種情形最容易造成癲癇持續發作？(A)服藥過量 (B)突然自行停藥 (C)對藥物產生耐受性 (D)對藥物產生抗藥性。
- 有關巴金森氏病 (Parkinson's disease) 的指導事項，下列何者正確？(A)穿著有釦子的衣服，以訓練手指的運動 (B)盡量保持活動狀態，使在忙碌中減少震顫 (C)穿著綁鞋帶固定的鞋子，防止鞋子脫落 (D)因常會拖延用餐，應催促用餐，以增加營養的攝取量。
- 顱內壓增高之庫辛三病徵 (Cushing's triad) 是指：1 嗜睡 2 噁心、嘔吐 3 血壓上升 4 心跳變慢 5 呼吸不規則 6 頭痛。(A)1 3 4 (B)2 3 5 (C)3 4 5 (D)2 5 6。
- 有關脊髓損傷病患進行膀胱訓練，導致自主神經過度反射所出現的臨床表徵，下列何者錯誤？(A)心搏過速 (B)高血壓 (C)豎毛肌痙攣 (D)搏動性頭痛。
- 有關庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome) 之臨床表徵，下列何者正確？(A)四肢肥胖 (B)體重減輕 (C)骨質疏鬆 (D)皮下脂肪增厚。
- 副甲狀素主要為調整體內哪些離子之恆定？(A)鈉與鉀 (B)鈣與磷 (C)氯與鈉 (D)鈉與磷。
- 關於接受甲狀腺切除術病人的衛生指導內容，下列何者正確？(A)向病人解釋手術後聲音嘶啞，是因傷及副甲狀腺所致 (B)告知病人避免咳嗽，以免傷口縫線裂開 (C)向病人示範，臥床或移動時如何支托頭頸部 (D)告訴病人術後嘴唇周圍抽搦是正常現象，不必驚慌。
- 有關胰島素注射之部位，下列何者吸收速度最快？(A)腹部 (B)髖部 (C)大腿前側 (D)手臂外側。
- 下列何種內分泌疾病不會造成高血壓？(A)愛迪生氏症 (B)嗜鉻細胞瘤 (C)原發性醛固酮過多症 (D)庫欣氏症候群。
- 下列何者不是消化性潰瘍藥物治療的原則？(A)促進胃排空速率 (B)減少胃酸分泌 (C)中和胃酸 (D)保護胃黏膜障壁。
- 急性胰臟炎發作 24 小時內，下列何種血中酵素值會顯著升高？(A)胰蛋白 (trypsin) (B)脂解 (lipase) (C)澱粉 (amylase) (D)胃蛋白 (pepsin)。

13. 哪些電解質不平衡會增加毛地黃中毒之危險？1 高血鉀 2 低血鉀 3 高血鈣 4 低血鈣 5 低血鈉。(A)13 (B)24 (C)15 (D)23。
14. 急性心肌梗塞之個案接受血栓溶解治療 (thrombolytic therapy)，其主要的合併症為：(A)MI 會更嚴重 (B)肺栓塞 (C)出血 (D)冠狀動脈破裂。
15. 下列哪一種的心律不整會有致命的危險？(A)心搏過慢 (B)心室早發性收縮 (C)心室纖維顫動 (D)心房早期收縮。
16. 李太太主訴其下肢在白天時會水腫，到晚上就消失，妳應聯想到：(A)肺水腫 (B)右心衰竭 (C)心肌梗塞 (D)肺部疾病。
17. 使用毛地黃的心臟病病患，最常出現的副作用是：(A)呼吸系統受損 (B)泌尿系統受損 (C)白血球減少 (D)消化道不適。
18. 王太太 65 歲，患有高血壓，經醫生指示服用降壓藥，突然發生軟弱無力、暈厥感及噁心不適情形，血壓為 80/50 mmHg，此時應：(A)請病人立刻躺下，把腳抬高超過頭部 (B)讓病人步行以增加靜脈的回流 (C)讓病人採坐姿 (D)持續原有之姿勢，並通知醫生。
19. 慢性阻塞性肺疾病患者長期缺氧，導致肺高壓，易造成何種合併症？(A)肺炎 (B)肺心病 (C)肝腫大 (D)左心衰竭。
20. 病人因換氣不足產生呼吸性酸中毒時，體內為維持酸鹼平衡，那一個系統會出現代償性反應？(A)心臟 (B)腦幹 (C)肝臟 (D)腎臟。
21. 進行胸腔放液穿刺術時，最好協助病患採坐姿、趴在床旁桌上，此一措施的主要目的為何？(A)降低病患恐懼感 (B)提高腹式呼吸效益 (C)使肋骨上舉清楚顯示穿刺部位 (D)減少肢體活動度。
22. 有關結核病患服用 rifampin 之護理指導，下列何者正確？(A)同時需補充 Vit. B₆ 以預防周邊神經炎 (B)尿液及分泌物呈橘色是正常的 (C)藥物之副作用為聽力障礙 (D)會產生不可逆性之視神經炎。
23. 何種癌症與 E-B 病毒有關？(A)肺癌 (B)絨毛膜癌 (C)鼻咽癌 (D)肝癌。
24. 癌症病人做化學治療前需大量補充水份，其主要目的是：(A)促進食慾 (B)增加營養的輸送力 (C)預防癌症細胞快速溶解症候群 (D)預防感染。
25. 全身照射線會傷害或破壞骨髓，使其不能發揮正常功能，你認為其結果可能造成？(A)紅血球數目減少 (B)對感染的抵抗力增加 (C)骨折傾向增加 (D)血液黏稠度增加。
26. 下列血清免疫檢查項目，何者為全身性紅斑性狼瘡(SLE)最主要之診斷指標？(A)抗核性抗體(ANA)(+) (B)抗DNA抗體 (+) (C)C3及C4補體 (+) (D)梅毒檢查(VDRL)呈偽陽性。
27. AIDS 患者所服用的 AZT 的治療作用為何？(A)抑制細胞合成 (B)抑制病毒繁殖中所需的反轉錄酶(reverse transcriptase) (C)抑制 DNA 的合成 (D)X 染色體異常。
28. 下列造成骨質疏鬆症的危險因素何者有誤？(A)婦女停經後動情激素分泌不足 (B)缺乏運動 (C)飲食之中缺乏維生素 K (D)大量攝取咖啡或酒精。
29. 為促進膠原(collagen)形成，以助傷口癒合，應鼓勵病人攝取何種營養素？(A)蛋白質及維生素 C (B)維生素 C、E (C)蛋白質及動物性脂肪 (D)維生素 D 及多種礦物質。
30. 脂肪栓塞症候群是骨折合併症之一，下列有關之敘述何者錯誤？(A)常發生於長骨骨折之後 (B)症狀發展緩慢 (C)會造成血管內血小板凝集反應 (D)預防重於治療。
31. 結腸造瘻口 (colostomy)，外觀正常的顏色應是：(A)蒼白色 (B)暗紅色 (C)粉紅色 (D)暗藍色。
32. 黃麴毒素 (aflatoxin) 會導致何種癌症？(A)膽管癌 (B)胰臟頭癌 (C)食道癌 (D)原發性肝細胞癌。

33. 缺鐵性貧血個案，口服鐵劑之衛教不包括：(A)會出現腹瀉之副作用 (B)與柳橙汁一起服用 (C)以吸管服用 (D)會解黑色大便。
34. 針對幽門螺旋桿菌所引起的消化性潰瘍，除一般之胃藥外，還需合併使用下列何種藥物治療？(A)類固醇 (B)抗生素 (C)擬交感神經藥物 (D)擬副交感神經藥物。
35. 關於膽囊炎的敘述，何者為非？(A)急性膽囊炎會有右上腹疼痛 (B)急性期需禁食 (C)好發於女性 (D)慢性膽囊炎應採高脂飲食。
36. 有關尿毒症患者皮膚搔癢不適的護理措施，下列何者錯誤？(A)告知其為尿素霜或鈣磷沈積所致 (B)可採熱敷以降低不適 (C)沐浴後使用 Calamine 乳劑 (D)修剪指甲避免抓傷。
37. 下列何者須限制蛋白質的攝取？(A)腎膿瘍 (B)慢性腎盂腎炎 (C)急性腎絲球腎炎 (D)腎病症候群。
38. 有關腎臟活體組織切片檢查後的護理措施，下列何者正確？(A)限制飲水 (B)鼓勵 2 小時後下床活動，以利血循 (C)鼓勵深呼吸及用力咳嗽，以利排痰 (D)注意有無腹痛現象。
39. 下列何項不是膀胱炎常見的症狀？(A)頻尿 (B)急尿 (C)尿糖 (D)排尿有燒灼感。
40. 下列何者為腹膜透析最主要的合併症？(A)阻塞 (B)疼痛 (C)感染 (D)出血。