

佛光大學

113 學年度研究所碩士班招生考試試題卷

學系別：心理學系碩士班臨床心理學組

科目：變態心理學

用紙第 1 頁共 3 頁

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

一、簡答題（30 分）

1. 請簡要地描述思覺失調症（schizophrenia）三大範疇的症狀各為何，並在三範疇各舉出一個現象上的例子。（15 分）
2. 請說明反芻（rumination）、擔憂（worry）與強迫性思考（obsession）三者間的異同，各自又主要出現在哪種疾病？（15 分）

二、名詞解釋（40 分，每題 4 分）

1. 防衛機轉（defense mechanism）
2. 暫停（time-out）
3. 雙盲實驗（double-blind procedure）
4. 恐慌攻擊（panic attack）
5. 心理急救（psychological first aid）
6. 失自我感（depersonalization）
7. 心理障礙症（psychological disorder）
8. 譫妄（delirium）
9. 認知儲備（cognitive reserve）
10. 外化疾患（external disorder）

三、選擇題（30 分，每題 3 分）

1. Beck 的憂鬱症認知理論中不包括下列何者
 - A. 負向自我
 - B. 反芻性思考
 - C. 訊息處理偏誤
 - D. 以上皆是 Beck 理論中提及的元素
2. 關於雙相情緒障礙症（bipolar disorder）治療的描述，以下何者正確
 - A. 心理治療是第一線治療
 - B. 強證據支持家庭焦點治療（family-focused therapy）對於雙相情緒障礙症之控制有一定成效
 - C. 心理衛教（psychoeducation）對於雙相情緒障礙症的控制幫助並不大
 - D. 以上皆正確

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

3. 關於病理理論與根據該病理理論所發展出的相應治療間之配對，下列何者錯誤
 - A. 多巴胺理論 (dopamine theory) → 電痙攣治療 (Electroconvulsive therapy)
 - B. Mowrer 雙因子模式 (Mowrer's two-factor model) → 暴露 (exposure)
 - C. 想法—行動融合 (thought-action fusion) → 改變相應的非理性信念
 - D. 高情緒表露 (high emotion expression) → 針對溝通模式的家庭治療
4. 非自殺性自傷 (nonsuicidal self-injury) 意指
 - A. 想要自我傷害的想法
 - B. 想要自殺卻不敢執行傷害性高的直接行動，因此以較為迂迴的方式進行，例如絕食、刻意讓自己生病、進行高風險的活動等
 - C. 目的不是要自殺的自我傷害行為，如較淺的割腕、用煙頭燙自己等
 - D. 意圖自殺，但是並沒有真的造成自己死亡的自我傷害行為
5. 求助於臨床心理師的小 A 自述有非常嚴重的潔癖，例如他在公共場所都會戴手套，且在摸了任何東西後，都要立刻用乾洗手反覆清潔手套。回到家後需要在玄關區域馬上脫掉全身衣物放進專用髒衣籃，並用酒精清潔手脚後立刻去洗澡。如果不這麼做的話，他心裡會一直出現「細菌病毒爬滿全身」的畫面。心理師決定根據暴露與反應預防 (exposure and response prevention) 執行治療，以下那個是可能的作法？
 - A. 讓小 A 不戴手套在診間摸東西，並且摸完不可以洗手
 - B. 讓小 A 不戴手套在診間摸東西，並且要盡量想別的事情，不可以想「細菌病毒爬滿全身」的畫面
 - C. AB 都是合乎暴露與反應預防的作法
 - D. AB 都是不合乎暴露與反應預防的作法
6. 以下哪項因素，可能增加物質使用疾患的發生？
 - A. 壓力事件與負向情緒
 - B. 童年逆境經驗 (adverse childhood experiences)
 - C. 社會文化對使用物質的正向態度，如成功者在奢華環境中飲用酒品的廣告
 - D. 以上皆是

※ 請務必將答案寫於答案卷，寫於本試題卷上不予計分

7. 以下哪兩種疾患在同時被診斷發生在同一個病人身上是合乎精神疾病診斷與統計手冊第五版 (DSM-5) 的診斷邏輯的？
- A. 重鬱症 (depressive disorder) 與雙相情緒障礙症 (bipolar disorder)
 - B. 創傷後壓力症 (posttraumatic stress disorder) 與急性壓力症 (acute stress disorder)
 - C. 自閉症類群障礙症 (autism spectrum disorder) 與注意力不足/過動症 (attention-deficit/hyperactivity disorder)
 - D. 思覺失調症 (schizophrenia) 與情感性思覺失調症 (schizoaffective disorder)
8. 以下何者不是自閉症類群障礙症的典型症狀？
- A. 缺乏共同的注意力 (joint attention)
 - B. 緩慢的動作
 - C. 無法理解他人的心智運作
 - D. 重複、侷限的行為
9. 在目前的研究發現中，思覺失調症相關的腦區特徵不包括下列何者
- A. 較小的腦室 (ventricles)
 - B. 較小的前額葉 (prefrontal cortex)
 - C. 較小的海馬迴 (hippocampus)
 - D. 前葉 (frontal lobe) 與顳葉 (temporal lobe) 之間的神經連結性較差
10. 小甲是個青春期的男性，極度在乎自己的體重，他總是覺得自己身形臃腫難看，儘管他的身高體重是 175cm / 61kg。因此，他盡可能的吃得較少。但是當他忍耐不住的時候，他會一口氣吃下相當大量的食物，然後馬上用催吐的方式把食物吐出來。請問小乙最可能罹患了
- A. 強迫症 (obsessive-compulsive disorder)
 - B. 厭食症 (anorexia nervosa)
 - C. 暴食症 (bulimia nervosa)
 - D. 嗜食症 (binge eating disorder)