

注意：考試開始鈴響前，不得翻閱試題，
並不得書寫、畫記、作答。

國立清華大學 115 學年度碩士班考試入學試題

系所班組別：科技管理研究所
乙組

科目代碼：5001

考試科目：微積分

—作答注意事項—

1. 請核對答案卷（卡）上之准考證號、科目名稱是否正確。
2. 考試開始後，請於作答前先翻閱整份試題，是否有污損或試題印刷不清，得舉手請監試人員處理，但不得要求解釋題意。
3. 考生限在答案卷上標記「由此開始作答」區內作答，且不可書寫姓名、准考證號或與作答無關之其他文字或符號。
4. 答案卷用盡不得要求加頁。
5. 答案卷可用任何書寫工具作答，惟為方便閱卷辨識，請儘量使用藍色或黑色書寫；答案卡限用 2B 鉛筆畫記；如畫記不清（含未依範例畫記）致光學閱讀機無法辨識答案者，其後果一律由考生自行負責。
6. 提早交卷者不可攜出試題，請將試題連同答案卷（卡）交予監考人員，攜出將以違規論處。當節考試結束後試題將置於講台，可自行取回，本試場不負保管責任。
7. 其他應考規則、違規處理及扣分方式，請自行詳閱准考證明上「國立清華大學試場規則及違規處理辦法」，無法因本試題封面作答注意事項中未列明而稱未知悉。

國立清華大學 115 學年度碩士班考試入學試題

系所班組別：科技管理研究所乙組(0550)

考試科目（代碼）：微積分(5001)

共 1 頁，第 1 頁*請在【答案卷】作答

第一題填充部分，請將答案按照題號順序寫在答案卷上，不必寫演算過程。

第二~五題必須詳細寫出計算及證明過程，否則不予計分。

1. Fill in the blank with your answer (7 pts each)

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 - \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = \underline{\hspace{2cm}}.$

(c) $\int_1^3 e^{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(d) $\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

(e) If $f(x) = x^x$, find $f'(2)$. Ans: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(f) If $xy + y^3 = 1$, find the value of y' at the point where $x = 0$. Ans: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(g) Find the length of the curve $y = \int_1^x \sqrt{\sqrt{t} - 1} dt$, $1 \leq x \leq 16$. Ans: $\underline{\hspace{2cm}}.$

(h) Find the sum of the series $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln 2)^n \left(1 + \frac{1}{n!}\right)$. Ans: $\underline{\hspace{2cm}}.$

2. (10 pts)

(a) State the Mean Value Theorem.

(b) Show that

$$|\sin a - \sin b| \leq |a - b| \quad \text{for all } a, b \in \mathbb{R}.$$

3. (10 pts) Among all the ellipses

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

that pass through the point $(3, 4)$, which one has the smallest area?

4. (12 pts) The curve $y = \cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ is rotated about the x -axis to generate a solid.

(a) Find its volume.

(b) Find its surface area.

5. (12 pts) Suppose that a function f satisfies the following conditions for all $x, y \in \mathbb{R}$:

(i) $f(x+y) = f(x)f(y)$

(ii) $f(x) = 1 + xg(x)$, where $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$.

Show that the derivative $f'(x)$ exists at every value of x and that $f'(x) = f(x)$.